

核准日期：2018年05月08日

修订日期：2019年01月03日、2020年06月01日、2023年05月25日、2023年10月20日

BIOHUI®

博晖生物

在大病人免疫球蛋白说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

警示语：本品因原料来自人血，虽然对原料血浆进行了相关病原体的筛查，并在生产工艺中加入了去除和灭活病毒的措施，但理论上仍存在传播某些已知和未知病原体的潜在风险，临床使用时应权衡利弊。

【适应症】

1. 成分：人免疫球蛋白，含有人体血清中的各种抗体。

2. 用法：肌肉注射。

3. 规格：每瓶含人免疫球蛋白200mg（10ml）。

4. 不良反应：本品为生物制品，少数人可发生过敏反应。

5. 禁忌：对本品过敏者禁用。

6. 注意事项：本品为生物制品，少数人可发生过敏反应。

7. 贮藏：2-8℃冷藏，避光。

8. 有效期：24个月。

9. 包装：每瓶200mg（10ml）。

10. 批号：见包装。

11. 生产企业：博晖生物。

12. 地址：博晖生物。

13. 电话：博晖生物。

14. 传真：博晖生物。

15. 邮编：博晖生物。

16. 网址：博晖生物。

17. 其他：博晖生物。

18. 备注：博晖生物。

19. 其他：博晖生物。

20. 备注：博晖生物。

器具，注射剂量按200mg/kg体重计算（普通剂量）。

2. 用法：肌肉注射，如所需总剂量大于10ml，可分1-2次注射。

3. 规格：每瓶含人免疫球蛋白200mg（10ml）。

4. 不良反应：本品为生物制品，少数人可发生过敏反应。

5. 禁忌：对本品过敏者禁用。

6. 注意事项：本品为生物制品，少数人可发生过敏反应。

7. 贮藏：2-8℃冷藏，避光。

8. 有效期：24个月。

9. 包装：每瓶200mg（10ml）。

10. 批号：见包装。

11. 生产企业：博晖生物。

12. 地址：博晖生物。

13. 电话：博晖生物。

14. 传真：博晖生物。

15. 邮编：博晖生物。

16. 网址：博晖生物。

17. 其他：博晖生物。

18. 备注：博晖生物。

19. 其他：博晖生物。

20. 备注：博晖生物。

【成份】

1. 主要成份：人免疫球蛋白。

2. 辅料：羧甲基、羟甲基。

【性状】

本品为无色或淡黄色澄明液体，可带光泽，无沉淀。

3. 性状：本品为无色或淡黄色澄明液体，可带光泽，无沉淀。

4. 性状：本品为无色或淡黄色澄明液体，可带光泽，无沉淀。

5. 性状：本品为无色或淡黄色澄明液体，可带光泽，无沉淀。

6. 性状：本品为无色或淡黄色澄明液体，可带光泽，无沉淀。

7. 性状：本品为无色或淡黄色澄明液体，可带光泽，无沉淀。

8. 性状：本品为无色或淡黄色澄明液体，可带光泽，无沉淀。

9. 性状：本品为无色或淡黄色澄明液体，可带光泽，无沉淀。

10. 性状：本品为无色或淡黄色澄明液体，可带光泽，无沉淀。

11. 性状：本品为无色或淡黄色澄明液体，可带光泽，无沉淀。

12. 性状：本品为无色或淡黄色澄明液体，可带光泽，无沉淀。

13. 性状：本品为无色或淡黄色澄明液体，可带光泽，无沉淀。

14. 性状：本品为无色或淡黄色澄明液体，可带光泽，无沉淀。

15. 性状：本品为无色或淡黄色澄明液体，可带光泽，无沉淀。

16. 性状：本品为无色或淡黄色澄明液体，可带光泽，无沉淀。

17. 性状：本品为无色或淡黄色澄明液体，可带光泽，无沉淀。

18. 性状：本品为无色或淡黄色澄明液体，可带光泽，无沉淀。

19. 性状：本品为无色或淡黄色澄明液体，可带光泽，无沉淀。

20. 性状：本品为无色或淡黄色澄明液体，可带光泽，无沉淀。

【不良反应】

本品为生物制品，少数人可发生过敏反应。

1. 过敏反应：本品为生物制品，少数人可发生过敏反应。

2. 过敏反应：本品为生物制品，少数人可发生过敏反应。

3. 过敏反应：本品为生物制品，少数人可发生过敏反应。

4. 过敏反应：本品为生物制品，少数人可发生过敏反应。

5. 过敏反应：本品为生物制品，少数人可发生过敏反应。

6. 过敏反应：本品为生物制品，少数人可发生过敏反应。

7. 过敏反应：本品为生物制品，少数人可发生过敏反应。

8. 过敏反应：本品为生物制品，少数人可发生过敏反应。

9. 过敏反应：本品为生物制品，少数人可发生过敏反应。

10. 过敏反应：本品为生物制品，少数人可发生过敏反应。

11. 过敏反应：本品为生物制品，少数人可发生过敏反应。

12. 过敏反应：本品为生物制品，少数人可发生过敏反应。

13. 过敏反应：本品为生物制品，少数人可发生过敏反应。

14. 过敏反应：本品为生物制品，少数人可发生过敏反应。

15. 过敏反应：本品为生物制品，少数人可发生过敏反应。

16. 过敏反应：本品为生物制品，少数人可发生过敏反应。

17. 过敏反应：本品为生物制品，少数人可发生过敏反应。

18. 过敏反应：本品为生物制品，少数人可发生过敏反应。

19. 过敏反应：本品为生物制品，少数人可发生过敏反应。

20. 过敏反应：本品为生物制品，少数人可发生过敏反应。

【规格】

每瓶含人免疫球蛋白200mg（10ml）。

每瓶含人免疫球蛋白200mg（10ml）。

每瓶含人免疫球蛋白200mg（10ml）。

每瓶含人免疫球蛋白200mg（10ml）。

每瓶含人免疫球蛋白200mg（10ml）。

每瓶含人免疫球蛋白200mg（10ml）。

每瓶含人免疫球蛋白200mg（10ml）。

每瓶含人免疫球蛋白200mg（10ml）。

每瓶含人免疫球蛋白200mg（10ml）。

每瓶含人免疫球蛋白200mg（10ml）。

每瓶含人免疫球蛋白200mg（10ml）。

每瓶含人免疫球蛋白200mg（10ml）。

每瓶含人免疫球蛋白200mg（10ml）。

【用法用量】

用法：及时彻底清创后，于受伤部位用本品总剂量的1/2分2次皮下注射，余1/2分2次进行肌肉注射（必要时）。

用法：及时彻底清创后，于受伤部位用本品总剂量的1/2分2次皮下注射，余1/2分2次进行肌肉注射（必要时）。

用法：及时彻底清创后，于受伤部位用本品总剂量的1/2分2次皮下注射，余1/2分2次进行肌肉注射（必要时）。

用法：及时彻底清创后，于受伤部位用本品总剂量的1/2分2次皮下注射，余1/2分2次进行肌肉注射（必要时）。

用法：及时彻底清创后，于受伤部位用本品总剂量的1/2分2次皮下注射，余1/2分2次进行肌肉注射（必要时）。

用法：及时彻底清创后，于受伤部位用本品总剂量的1/2分2次皮下注射，余1/2分2次进行肌肉注射（必要时）。

用法：及时彻底清创后，于受伤部位用本品总剂量的1/2分2次皮下注射，余1/2分2次进行肌肉注射（必要时）。

用法：及时彻底清创后，于受伤部位用本品总剂量的1/2分2次皮下注射，余1/2分2次进行肌肉注射（必要时）。

用法：及时彻底清创后，于受伤部位用本品总剂量的1/2分2次皮下注射，余1/2分2次进行肌肉注射（必要时）。

用法：及时彻底清创后，于受伤部位用本品总剂量的1/2分2次皮下注射，余1/2分2次进行肌肉注射（必要时）。

用法：及时彻底清创后，于受伤部位用本品总剂量的1/2分2次皮下注射，余1/2分2次进行肌肉注射（必要时）。

【禁忌】

2. 右旋lgA抗原的选择性lgA缺乏者禁用。

【注意事項】

1. 本品不得用作静脉注射。
2. 本品肌肉注射不需做过敏试验。

[illegible]

病斑病 能行治疗的牙科医生

[illegible]

新 注射用氯化丁基橡胶塞



1000

FD500USZU10

【批准文号】

沽港序929180005

Y 25 易貼主竹可培壽日人

博隆生物科技(上海)有限公司

【生产企业】

大北农、通威生物制药、冠农、古阳八三、
湖北天农、博隆生物制药、湖北有朋、CPB

地址：石家庄市鹿泉县灰窑井安民街6号

不可靠的参 邮政编码: 050200

由话号码 0311-83935518

【药物相互作用】

使用这面后，不建议再次使用本品，因为
你病的不会走远。

② 使用大剂量，2个日内不得接种该疫苗
因为抗体干扰疫苗免疫应答

【药物过量】

【物理】

五臟在六穴皆病者死 諸毒之而致者則死

未知病原而刺其血 病者之起則治之免其

市本部的「臺灣照相所」。

取反应(已描述在体外)情形, 记为 $\rho_{\text{P-24}}$
 不反应, 记为 $\rho_{\text{P-24}}$ 空列

【包装】

【包装】

注意监测而松松更重。中国注射玻璃管制注射器

禁冻结 36个月 (有效期)

【孕妇及哺乳期妇女用药】

尚不清楚使用本品是否会影响生殖能力以及
孕在孕早期使用本品是否会对胎儿产生不良
影响。使用时应尽量避免在分娩前使用。

香田药1

去去只进行该项针对性试验研究, 其余系统仍

【記者吳育鈞】

未专门进行该项针对性试验研究。且无参考文献。