



3.国外上市后监测
(1) 皮肤及其附件损害：史蒂文斯-约翰逊综合征等。
(2) 神经系统损害：癫痫发作、无菌性脑膜炎等。
(4) 血管损害和出凝血障碍：血栓形成等。
(5) 血液系统损害：血浆黏度增加、溶血反应等。
(6) 泌尿系统损害：肝功能损害等。
【禁忌】
1.对人免疫球蛋白过敏或有其他严重过敏史者。
2.有抗IgA抗体的选择性IgA缺乏者。
2.如需要，可以用5%葡萄糖溶液稀释本品，但糖尿病患者应慎用。
3.药液呈现混浊、沉淀、异物或瓶子有裂纹、过期失效等情况下，不得使用。
4.本品开启后，应一次输注完毕，不得分次或给第二人输用。
5.有严重酸碱代谢紊乱的患者应慎用。
9.可能发生溶血性贫血，监测溶血和溶血性贫血患者的临床体征和症状。
【孕妇及哺乳期妇女用药】
在孕妇及哺乳期妇女用药安全性方面，本品目前尚无临床研究资料，因此使用时须谨慎。
【药物相互作用】
本品尚无与其它药物相互作用的临床研究资料，因此
【药物过量】
本品尚无超过推荐剂量的
【药理毒理】
本品含有广谱病毒、细菌
能力和发挥免疫调节功能
【药代动力学】
本品目前尚无体内半衰期的
【贮藏】
2～8℃避光保存和运输
【包装】
中硼硅玻璃模制注射
【有效期】
36个月。
【执行标准】
【批准文号】
国药准字S2020
【药品上市许可持
【生产企业】
企业名称:博晖生
生产地址:石家庄
邮政编码:0502
电话号码:0311