

核准日期：2018年05月08日

修订日期：2019年01月08日、2020年06月01日、2022年12月25日、2023年01月25日

RIOHUI
瑞晖生物

瑞晖人血白蛋白注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

警告语：本品因原料来自人血，虽然对原料血浆进行了相关病原体的筛查，并在生产工艺中加入了去除和灭活病毒的措施，但理论上仍存在传播某些已知和未知病原体的潜在风险。临床使用时应权衡利弊。

【适应症】

低蛋白血症

肝硬化、肾炎、肾病综合征

用量：注射剂量按200ml/kg体重计算（或遵医嘱）

用法：加药瓶总剂量小于10ml，可分

次注射，每次注射量不得超过10ml。

注射部位和器具要严格分开。

【成份】

创不良不良反应

本品由人血白蛋白经分离、纯化、

并确定总效的人群中

辅料：去氧糖、甘氨酸

常发生，可能由于白

【性状】

本品为无色、澄明、无可见异物

寒、寒战等

【用法】

肌、静脉注射

【不良反应】

头晕、头痛、寒战、低血压、过敏反应等

【规格】

本品为无色、澄明、无可见异物

本品为无色、澄明、无可见异物

给药系统

瑞晖生物

免疫系统、过敏反应、类过敏反应、过敏性休克等

【用法用量】

心血管系统：面色苍白/潮红、脉搏异常、心悸、血压降

用法：及时彻底清创后，于受伤部位用本品总剂量的

和血

1/2至1/3，按创面积，每次10-20ml，或按体重，每次10-20ml。

本品为无色、澄明、无可见异物

